

4-15-2008

Desigualdades en salud: ¿Es diferente la percepción de morbilidad de varones y mujeres?

E. López

L. Findling

M. Abramzón

Follow this and additional works at: https://digitalrepository.unm.edu/lasm_cucs_es

Recommended Citation

López, E.; L. Findling; and M. Abramzón. "Desigualdades en salud: ¿Es diferente la percepción de morbilidad de varones y mujeres?." (2008). https://digitalrepository.unm.edu/lasm_cucs_es/35

This Article is brought to you for free and open access by the Latin American Social Medicine at UNM Digital Repository. It has been accepted for inclusion in Spanish by an authorized administrator of UNM Digital Repository. For more information, please contact disc@unm.edu.

SC20062(1)López-Findling-Abramzón

López E, Findling L, Abramzón M. Desigualdades en salud: ¿Es diferente la percepción de morbilidad de varones y mujeres? Salud Colectiva (Buenos Aires, Argentina) 2006 enero- abril; 2 (1):61-74.

Objetivos: Conocer las desigualdades en la percepción de la morbilidad y en el cuidado de la salud de la población de Buenos Aires, Argentina.

Metodología: Análisis de datos secundarios de la encuesta de Utilización y Gasto en Servicios de Salud del Ministerio de Salud de la Nación (2003).

Resultados: Los autores encuentran desigualdades en la percepción de los participantes asociadas a la edad y al sexo. Por la edad señalan la conciencia del aumento de probabilidades que se tiene de enfermar y de morir conforme se avanza en las etapas del ciclo de vida de las personas. Por el sexo, la percepción se diferencia en cuanto a la opinión menos favorable respecto de su salud que tienen las mujeres. La actitud más cercana de las mujeres a los servicios de salud y a sus prestadores la explican por la relación médico-paciente-institución que se establece durante el control del embarazo, la atención del parto, la atención de la salud de los hijos y del resto del grupo familiar. Los datos de la encuesta muestran que los hombres consultan menos a los médicos que las mujeres. La percepción del estado de salud es más positiva en los varones, y la frecuencia de consulta aumenta con la edad en ambos sexos. Finalmente, a mayor nivel de educación e instrucción la percepción del estado de salud es más favorable.

Conclusiones: La salud de los hombres y las mujeres es diferente y desigual. El sexo y la edad, además de marcar diferencias biológicas en la determinación de los problemas de salud, constituyen mediadores sociales, culturales, históricos, políticos y económicos que pueden ser interpretados desde una perspectiva de género, donde se explique las diferencias de la salud tomando en cuenta su multidimensionalidad. Las autoras afirman que es necesario diseñar programas y políticas sanitarias que sean más eficientes e incluyentes para reducir las inequidades en la salud entre hombres y mujeres